

**หากถูกกัดแล้ว
ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?**

- ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด**
ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงกันแผล
และล้างออกให้หมด
(ถ้าจำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล
จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**
- ทายาเบตาดีน**
และรีบมาพบแพทย์
โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษ
และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- กักสุนัขเพื่อดูอาการ 10 วัน**
ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย
แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด**
และควรเข้ารับวัคซีน
ให้ตรงตามที่แพทย์นัด

**ป้องกันสุนัขกัด
ได้อย่างไร ?**

หลักคณา 5 ย. ได้แก่
“อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”

- อย่าแหย่**
ให้สุนัขโมโห
- อย่าเหยียบ** สุนัข
หรือทำให้ตกใจ
- อย่าแยก** สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า
- อย่าหยิบ** ชามอาหาร
หรือของที่สุนัขหวง
- อย่ายุ่ง** กับสุนัขจรจัด
หรือสุนัขที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน




สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

f กรมควบคุมโรค

@line1422

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

**โรค
พิษสุนัขบ้า**

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้นานเกิดอาการ จะเสียชีวิต ทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
โรคพิษสุนัขบ้า



สัตว์ที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า มีอาการอย่างไร?



สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก



มีอาการและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง

2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วังเวกกัดคนหรือสัตว์



3. ระยะอัมพาต

ค้างคาง ลิ้นห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดต่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อยก็สามารถติดต่อได้



2. ถูกเลียที่บาดแผล รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน รวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา



อาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

- **อาการเริ่มแรก:** ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
- **อาการทางประสาท:** กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว
- **อาการระยะสุดท้าย:** กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หดสติและเสียชีวิตในที่สุด

